

MẪU NHÃN

1 - Mẫu nhãn trên ống:



2 - Mẫu hộp (Hộp 10 ống 2ml):



Rx THUỐC BÁN THEO ĐƠN

DUNG DỊCH TIÊM
GENTAMICIN
80mg/2ml
Hộp 10 ống 2ml

TB - TM

Hộp 10 ống 2ml



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯ VIDIPHA
184/2, Lê Văn Sỹ, P.10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
ĐT: (08)-38440106 Fax: (84-8)-38440446
Sản xuất tại chi nhánh
CÔNG TY CPDP TƯ VIDIPHA TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

GMP - WHO

VIDIPHA

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XÁ TẨM TAY CỦA TRẺ EM
BẢO QUẢN NƠI KHÔ, NHỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C,
TRẠM ANH SÁNG

SOLUTION FOR INJECTION

GENTAMICIN
80mg/2ml
Box of 2ml x 10 amps.

Tiêu chuẩn (Specification): TCCS (In house) Số lô SX/Lot No. :
SDK (Reg.no): Ngày SX/Mfg. Date: HD/Exp. Date :

Rx PRESCRIPTION DRUG

SOLUTION FOR INJECTION

GENTAMICIN
80mg/2ml
IM - IV


Box of 2ml x 10 amps.



VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT - STOCK COMPANY
184/2 Le Van Sy St., Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City - VIETNAM
Tel: (08)-38440106 Fax: (84-8)-38440446
Manufactured by
BRANCH OF VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL J.S.C. BINH DUONG
Tan Binh Hamlet, Tan Hiep Commune, Tan Uyen District, Binh Duong Province

GMP - WHO

VIDIPHA



SOLUTION FOR INJECTION
GENTAMICIN
80mg/2ml
Box of 2ml x 10 amps.



3 - Mẫu hộp (Hộp 50 ống 2ml) mặt 1:



CHỦ TỊCH HĐ QUẢN TRỊ
DS. KIỀU HỮU

Box of 2ml x 50 amps.

SDK (Reg.no):

COMPOSITION: Each 2ml ampoule contains:
Gentamicin sulfate equivalent to gentamicin 80mg
Excipients.....q.s.p 2ml

INDICATION, CONTRAINDICATION, DOSAGE,
ADMINISTRATION & MORE INFORMATION:
See the leaflet inside.

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE
KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
STORE IN DRY PLACES, AT TEMPERATURE NOT EXCEEDING 30°C,
PROTECT FROM LIGHT

Rx THUỐC BÁN THEO ĐƠN
Hộp 50 ống 2ml
Rx Prescription Drug
Box of 2ml x 50 amps.


GENTAMICIN
Gentamicin 80mg/2ml
80 mg
SOLUTION FOR INJECTION
IM - IV
Rx Prescription Drug
Box of 2ml x 50 amps.

VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT - STOCK COMPANY
184/2 Le Van Sy St, Phu Nhieu Dist, Noi Canh Minh City - VIETNAM
Tel: (08) 38440109 Fax: (08) 38440048
Manufactured by
BRANCH OF VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL J.S.C. BINH DUONG
Tin Bien District, Tan Nhap Commune, Tan Uyen District, Binh Duong Province

GMP - WHO



4 - Mẫu hộp (Hộp 50 ống 2ml) mặt 2:



5.- MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: (MẶT A)

| | |
|---|--|
| Rx THUỐC BÁN THEO ĐƠN | GENTAMICIN 80mg/2ml DUNG DỊCH TIÊM |
| <p>THÀNH PHẦN: Mỗi ống 2ml chứa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hoạt chất chính: Gentamicin.....80mg (Đưới dạng gentamicin sulfat)• Tá dược: Natri bisulfit, dinatri edetat, natri hydroxyd, methylparaben, propylparaben, nước cất pha tiêm. <p>CHỈ ĐỊNH:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gentamicin thường được dùng phối hợp với các kháng sinh khác (beta - lactam) để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn nặng toàn thân gây ra bởi các vi khuẩn Gram âm và các vi khuẩn khác còn nhạy cảm, bao gồm: nhiễm khuẩn đường mật (viêm túi mật và viêm đường mật cấp), nhiễm Brucella, các nhiễm khuẩn trong bệnh nhày nhớt, viêm nội tẩm mạc, nhiễm khuẩn huyết, nhiễm Listeria, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn ngoài da như bỏng, loét, nhiễm khuẩn xương, khớp, nhiễm khuẩn trong ổ bụng (bao gồm viêm phúc mạc), các nhiễm khuẩn về đường tiết niệu (viêm bể thận cấp) cũng như trong việc phòng nhiễm khuẩn khi mổ và trong điều trị ở người bệnh suy giảm miễn dịch.• Gentamicin thường được dùng cùng với các chất diệt khuẩn khác để mở rộng phổ tác dụng và làm tăng hiệu lực điều trị. <p>CHỐNG CHỈ ĐỊNH:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mẫn cảm với kháng sinh nhóm aminoglycosid hay với bất kỳ thành phần nào trong công thức.• Nhược cơ. <p>LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:</p> <ul style="list-style-type: none">• Thường dùng tiêm bắp. Không dùng tiêm dưới da vì nguy cơ hoại tử da. Khi không tiêm bắp được, có thể dùng đường tiêm truyền tĩnh mạch không liên tục. Trường hợp này, pha gentamicin với dung dịch natri clorid hoặc glucose đẳng trương theo tỷ lệ 1 ml dịch truyền cho 1 mg gentamicin. Thời gian truyền kéo dài từ 30 - 60 phút. Với người bệnh có chức năng thận bình thường, cứ 8 giờ truyền 1 lần; ở người suy thận, khoảng cách thời gian truyền phải dài hơn.• Liều lượng phải điều chỉnh tùy theo tình trạng và tuổi tác người bệnh: Ở người bệnh có chức năng thận bình thường:<ul style="list-style-type: none">• Người lớn: 3mg/kg/ngày, chia làm 2 - 3 lần tiêm bắp.• Trẻ em: 3mg/kg/ngày, chia làm 3 lần tiêm bắp (1 mg/kg/lần, 8 giờ/lần)Người bệnh suy thận:<ul style="list-style-type: none">• Cần phải điều chỉnh liều, theo dõi đều đặn chức năng thận, chức năng ốc tai và tiền đình, đồng thời phải kiểm tra nồng độ thuốc trong huyết thanh (nếu điều kiện cho phép).Cách điều chỉnh liều theo nồng độ creatinin huyết thanh:<ul style="list-style-type: none">• Có thể giữ liều duy nhất 1 mg/kg và kéo dài khoảng cách giữa các lần tiêm. Khoảng cách giữa 2 lần tiêm = trị số creatinin huyết thanh (mg/lit) x 0,8.• Hoặc có thể giữ khoảng cách giữa 2 lần tiêm là 8 giờ, nhưng giảm liều dùng. Trong trường hợp này, sau khi tiêm 1 liều nạp là 1 mg/kg, cứ 8 giờ sau lại dùng 1 liều đã giảm bằng cách chia liều nạp cho một phần 10 (1/10) của trị số creatinin huyết thanh (mg/lit).Cách điều chỉnh liều theo độ thanh thải creatinin nội sinh:<ul style="list-style-type: none">• Dùng liều khởi đầu là 1mg/kg.• Các liều tiếp theo được tiêm cứ 8 giờ một lần, và tính theo công thức: Giá trị độ thanh thải creatinin của người bệnh 1 mg/kg x _____ Giá trị bình thường của độ thanh thải creatinin (100) Các giá trị của độ thanh thải creatinin được biểu thị bằng ml/phút.<p>Trường hợp thẩm tách máu định kỳ: tiêm tĩnh mạch chậm liều khởi đầu 1 mg/kg vào cuối buổi thẩm tách máu. Trường hợp thẩm tách phúc mạc: liều khởi đầu 1 mg/kg tiêm bắp. Trong khi thẩm tách, các lượng bị mất được bù bằng cách thêm 5 - 10 mg gentamicin cho 1 lít dịch thẩm tách.</p><p>TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:</p><ul style="list-style-type: none">• Thường gặp: nhiễm độc tai không hồi phục và do liều tích tụ, ảnh hưởng cả đến ốc tai (diếc ban đầu với âm tần số cao) và hệ thống tiền đình (chóng mặt, hoa mắt).• Ít gặp:<ul style="list-style-type: none">- Nhiễm độc thận có hồi phục. Suy thận cấp, thường nhẹ nhưng cũng có trường hợp hoại tử ống thận hoặc viêm thận kẽ.- Ức chế dẫn truyền thận kinh cơ, có trường hợp gây suy hô hấp và liệt cơ.- Tiêm dưới kết mạc gây đau, sưng huyết và phù kết mạc.- Tiêm trong mắt: thiếu máu cục bộ ở võng mạc.• Hiếm gặp:<ul style="list-style-type: none">- Phản ứng phản vệ.- Rối loạn chức năng gan (tăng men gan, tăng bilirubin máu).<p>Ghi chú: thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gấp phải khi sử dụng thuốc.</p><p>THẬN TRỌNG:</p><ul style="list-style-type: none">• Tất cả các aminoglycosid đều độc hại đối với cơ quan thính giác và thận.• Tác dụng không mong muốn quan trọng thường xảy ra với người bệnh cao tuổi và/hoặc với người bệnh đã bị suy thận. Cần phải theo dõi rất cẩn thận đối với người bệnh được điều trị với liều cao hoặc dài ngày, với trẻ em, người cao tuổi và người suy thận, ở họ, cần phải giảm liều.• Người bệnh có rối loạn chức năng thận, rối loạn thính giác...vì có nguy cơ bị độc hại với cơ quan thính giác nhiều hơn.• Phải sử dụng rất thận trọng nếu có chỉ định bắt buộc ở những người bị nhược cơ nặng, bị Parkinson hoặc có triệu chứng yếu cơ.• Nguy cơ nhiễm độc thận thấy ở người bị hạ huyết áp, hoặc có bệnh về gan hoặc phụ nữ. | |



CHỦ TỊCH HỘ QUẢN TRỊ
DS. KIỀU HỮU

✓

6.- MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:(MẶT B)

PHỤ NỮ MANG THAI: Tất cả các aminoglycosid đều qua nhau thai và có thể gây độc thận cho thai. Với gentamicin chưa có nghiên cứu đầy đủ trên người nhưng vì các aminoglycosid khác đều có thể gây diếc cho thai, cần phải cân nhắc lợi và hại khi phải dùng gentamicin trong những bệnh đe dọa tính mạng hoặc nghiêm trọng mà các thuốc khác không thể dùng được hoặc không hiệu lực.

PHỤ NỮ CHO CON BÚ: Các aminoglycosid được bài tiết vào sữa với lượng nhỏ. Tuy nhiên các aminoglycosid, kể cả gentamicin, được hấp thu kém qua đường tiêu hóa và chưa có tư liệu về vấn đề độc hại đối với trẻ đang bú mẹ.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: thận trọng khi dùng thuốc

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Sử dụng đồng thời với các thuốc gây độc cho thận như: các aminoglycosid khác, vancomycin, một số thuốc họ cephalosporin, hoặc với các thuốc tương đố với cơ quan thận giác như acid ethacrynic và có thể furosemid; các thuốc có tác dụng ức chế thận kinh cơ sẽ làm tăng nguy cơ gây độc.
- Indomethacin có thể làm tăng nồng độ huyết tương của các aminoglycosid nếu được dùng chung.
- Sử dụng chung với các thuốc chống nôn như dimenhydrinat có thể che lấp những triệu chứng đầu tiên của sự nhiễm độc tiến triển.

DƯỢC LỰC HỌC:

- Gentamicin sulfat là một kháng sinh thuộc nhóm aminoglycosid có tác dụng diệt khuẩn qua ức chế quá trình sinh tổng hợp protein của vi khuẩn. Phổ diệt khuẩn của gentamicin thực tế bao gồm các vi khuẩn hiếu khí Gram âm và các tụ cầu khuẩn, kể cả các chủng tạo ra penicillinase và kháng methicillin.
- Gentamicin ít có tác dụng đối với các khuẩn lầu cầu, liên cầu, phế cầu, não mô cầu, *Citrobacter*, *Providencia* và *Enterococci*. Các vi khuẩn ký khí bắt buộc như *Bacteroides*, *Clostridia* đều kháng gentamicin.
- Trong những năm gần đây thế giới quan tâm nhiều đến sự kháng thuốc đối với gentamicin. Ở Việt Nam các chủng *E. aerogenes*, *Klebsiella Pneumoniae*, trực khuẩn mủ xanh đều đã kháng gentamicin. Nhưng gentamicin vẫn còn tác dụng với *H.influenzae*, *Shigella flexneri*, tụ cầu vàng, *S.epidermidis* đặc biệt *Staphylococcus saprophyticus*, *Salmonella typhi* và *E.coli*.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Gentamicin không được hấp thu qua đường tiêu hóa.
- Gentamicin được sử dụng tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp. Đối với người bệnh có chức năng thận bình thường, sau khi tiêm bắp 30 - 60 phút liều 1 mg/kg thể trọng, nồng độ đỉnh huyết tương đạt được khoảng 4 microgam/ml, giống như nồng độ sau tiêm truyền tĩnh mạch. Thuốc ít gắn với protein huyết tương. Gentamicin khuếch tán chủ yếu vào các dịch ngoại bào và khuếch tán dễ dàng vào ngoại dịch tai trong.
- Nửa đời huyết tương của gentamicin từ 2 - 3 giờ, nhưng có thể kéo dài ở trẻ sơ sinh và người bệnh suy thận. Gentamicin không được chuyển hóa và được thải trừ (gần như không thay đổi) ra nước tiểu qua lọc ở cầu thận. Ở trạng thái ổn định có ít nhất 70% liều dùng được bài xuất ra nước tiểu trong 24 giờ và nồng độ trong nước tiểu có thể vượt quá 100 microgam/ml. Tuy vậy gentamicin tích lũy với mức độ nào đó ở các mô của cơ thể, nhất là trong thận. Vì khoảng cách giữa liều điều trị và liều gây độc của gentamicin tương đối nhỏ, do đó đòi hỏi phải có sự theo dõi cẩn thận. Hấp thu gentamicin qua đường tiêm bắp có thể bị hạn chế ở người bệnh nặng như trong tình trạng sốc, sự tưới máu giảm, hoặc ở người bệnh tăng thể tích dịch ngoại bào. Hoặc giảm độ thanh thải của thận bao gồm cả cổ trường, xơ gan, suy tim, suy dinh dưỡng, bong, bệnh nhạy mót và có thể trong bệnh bạch cầu.

TƯƠNG KÝ:

- Aminoglycosid bị mất hoạt tính *in vitro* bởi các penicillin và cephalosporin khác nhau do phản ứng với vòng beta-lactam; mức độ mất hoạt tính phụ thuộc vào nhiệt độ, nồng độ và thời gian tiếp xúc.
- Các aminoglycosid có độ ổn định khác nhau Amikacin là chất vững bền nhất, tobramycin bị bất hoạt nhạy nhất, gentamicin có độ bất hoạt trung gian. Gentamicin tương tự với furosemid, heparin, natri bicarbonat và một vài dung dịch truyền đường dùng ngoài đường tiêu hóa. Gentamicin có phản ứng với các chế phẩm có pH kiểm hoặc với các thuốc không ổn định ở pH acid.
- Không được trộn lẫn gentamicin và các aminoglycosid với các thuốc khác trong cùng một borm tiêm hoặc trong cùng một dịch truyền và không được tiêm chung cùng một đường tĩnh mạch. Khi các aminoglycosid được tiêm phối hợp với một beta-lactam thì phải tiêm ở những vị trí khác nhau.

QUẢ LIỆU, XỬ TRÍ:

- Vì không có thuốc giải độc đặc hiệu, điều trị quá liều hoặc các phản ứng độc của gentamicin là chữa trị triệu chứng và hỗ trợ.
- Cách điều trị được khuyến cáo như sau:
 - Thảm tách máu hoặc thảm tách phúc mạc để loại aminoglycosid ra khỏi máu của người bệnh suy thận.
 - Dùng các thuốc kháng cholinesterase, các muối calci, hoặc đường hô hấp nhân tạo để điều trị cho thận kinh cơ dẫn đến yếu cơ kéo dài và suy hô hấp hoặc liệt (ngừng thở) có thể xảy ra khi dùng hai hoặc nhiều aminoglycosid đồng thời.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Hộp 10 ống 2ml.
- Hộp 50 ống 2ml

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS

CHÚ Ý: THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SỸ

Không sử dụng thuốc nếu:

- Dung dịch thuốc bị biến màu, không trong suốt.
- Ống thuốc bị nứt, vỡ.
- Phải ngừng dùng thuốc ngay và thông báo cho bác sĩ khi gặp những triệu chứng dị ứng.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.
- Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhãn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHAR

184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP HCM


ĐT: (08) - 38440106 Fax: (84 - 8) - 38440446

Sản xuất tại: chi nhánh CÔNG TY CPDP T.U VIDIPHAR tỉnh Bình Dương

Ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

0470246-CTCP
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
VIDIPHAR
QUẬN PHÚ NHUẬN
TP. HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH HỘ QUẢN TRỊ
DS. KIỀU HỮU



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng